


## 上部消化管X線検査


性別	年齢	受診者数	正常者数 A・B判定(%)	経過観察者数 C0～C12判定(%)	要精検者数 D判定(%)	治療中 F判定(%)
男性	39歳以下	1,130	801 (70.9)	322 (28.5)	7 (0.6)	0
	40-49歳	2,430	1,482 (61.0)	922 (37.9)	26 (1.1)	0
	50-59歳	2,547	1,330 (52.2)	1,172 (46.0)	45 (1.8)	0
	60-69歳	1,263	500 (39.6)	731 (57.9)	31(3) (2.4)	1 (0.1)
	70歳以上	416	137 (32.9)	265 (63.7)	14 (3.4)	0
女性	39歳以下	674	427 (63.4)	244 (36.2)	3 (0.4)	0
	40-49歳	1,626	816 (50.2)	805 (49.5)	5 (0.3)	0
	50-59歳	1,651	665 (40.3)	961 (58.2)	24 (1.4)	1 (0.1)
	60-69歳	735	250 (34.0)	471 (64.1)	14 (1.9)	0
	70歳以上	194	61 (31.4)	129 (66.5)	4 (2.1)	0
計		12,666	6,469 (51.1)	6,022 (47.5)	173(3) (1.4)	2 (0.02)

赤字はがん発見数

上部消化管X線検査の受診者数は12,666人、このうち要精検者数は173人(1.4%)、治療中は2人(0.02%)でした。



受診者数は12,666人、このうち有所見者数は6,197人(48.9%)。男女とも加齢とともに有所見率が増加しています。



赤字はがん発見数

上部消化管X線検査で、3人の胃がんが発見されました。胃がんが発見された2人は、他施設で内視鏡による手術を行いました。

## 上部消化管X線検査における要受診・要経過観察所見

部位	所見	男性 7,786人		女性 4,880人		合計 12,666 人	
		要受診(%)	経過観察(%)	要受診(%)	経過観察(%)	要受診(%)	経過観察(%)
食道	食道炎	1 (0.01)	18 (0.2)	0	6 (0.1)	1 (0.01)	24 (0.2)
	食道びらん	0	0	0	0	0	0
	食道潰瘍	7 (0.09)	1 (0.01)	2 (0.04)	0	9 (0.07)	1 (0.01)
	食道潰瘍癒痕	0	1 (0.01)	0	0	0	1 (0.01)
	食道陥凹性病変	1 (0.01)	0	0	0	1 (0.01)	0
	食道ポリープ	1 (0.01)	32 (0.4)	2 (0.04)	17 (0.3)	3 (0.02)	49 (0.4)
	食道粘膜下腫瘍	1 (0.01)	4 (0.05)	0	2 (0.04)	1 (0.01)	6 (0.05)
	食道隆起性病変	7 (0.09)	4 (0.05)	1 (0.02)	4 (0.08)	8 (0.06)	8 (0.06)
	食道裂孔ヘルニア	0	115 (1.5)	0	35 (0.7)	0	150 (1.2)
	胃食道逆流症	0	0	0	0	0	0
	アカラシア	1 (0.01)	1 (0.01)	0	0	1 (0.01)	1 (0.01)
食道静脈瘤	0	1 (0.01)	0	0	0	1 (0.01)	
胃	胃炎	0	1,249 (16.0)	0	524 (10.7)	0	1,773 (14.0)
	萎縮性胃炎	0	17 (0.2)	0	15 (0.3)	0	32 (0.3)
	化生性胃炎	0	3 (0.04)	0	0	0	3 (0.02)
	胃びらん	0	0	0	0	0	0
	胃潰瘍	16 (0.2)	0	3 (0.06)	0	19 (0.2)	0
	胃潰瘍癒痕	21 (0.3)	18 (0.2)	7 (0.1)	1 (0.02)	28 (0.2)	19 (0.2)
	胃陥凹性病変	10(1) (0.1)	0	7 (0.1)	0	17(1) (0.1)	0
	胃ポリープ	4 (0.05)	1,708 (21.9)	6 (0.1)	1,901 (39.0)	10 (0.08)	3,609 (28.5)
	胃粘膜下腫瘍	13 (0.2)	25 (0.3)	8 (0.2)	37 (0.8)	21 (0.2)	62 (0.5)
	胃腺腫	0	0	0	0	0	0
	胃隆起性病変	27(2) (0.3)	8 (0.1)	7 (0.1)	5 (0.1)	34(2) (0.3)	13 (0.1)
	胃硬化像	4 (0.05)	4 (0.05)	2 (0.04)	3 (0.06)	6 (0.05)	7 (0.06)
胃巨大粘膜ひだ	0	4 (0.05)	1 (0.02)	0	1 (0.01)	4 (0.03)	
十二指腸	十二指腸びらん	0	0	0	0	0	0
	十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	0
	十二指腸潰瘍癒痕	0	130 (1.7)	0	37 (0.8)	0	167 (1.3)
	十二指腸ポリープ	4 (0.05)	10 (0.1)	0	11 (0.2)	4 (0.03)	21 (0.2)
	十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	0	0	0
	十二指腸腫瘍	0	0	0	0	0	0
	十二指腸隆起性病変	1 (0.01)	4 (0.05)	1 (0.02)	0	2 (0.02)	4 (0.03)
	リンパ過形成(十二指腸)	0	10 (0.1)	0	4 (0.08)	0	14 (0.1)

赤字はがん発見数

上部消化管X線検査の受診者数は12,666人、このうち男性7,786人、女性4,880人でした。所見としては、男性女性共に胃ポリープが最も多く、男性1,712人(22.0%)、女性1,907人(39.1%)が認められました。


上部消化管X線検査受診者のうち、がん発見数は3人(0.02%)で、胃がんでした。2症例は腹腔鏡手術となりました。

## 上部消化管内視鏡検査

性別	年齢	受診者数	正常者数 A・B判定(%)	経過観察者数 C0～C12判定(%)	要精検者数 D判定(%)	治療中 F判定(%)
男性	39歳以下	342	163 (47.7)	177 (51.8)	2 (0.6)	0
	40-49歳	1,275	539 (42.3)	726 (56.9)	10 (0.8)	0
	50-59歳	1,663	530 (31.9)	1,116 (67.1)	17(1) (1.0)	0
	60-69歳	1,142	239 (20.9)	890 (77.9)	12(3) (1.1)	1 (0.1)
	70歳以上	782	79 (10.1)	687 (87.9)	16(6) (2.0)	0
女性	39歳以下	201	105 (52.2)	93 (46.3)	3 (1.5)	0
	40-49歳	855	362 (42.3)	489 (57.2)	4(1) (0.5)	0
	50-59歳	1,117	392 (35.1)	718 (64.3)	7(2) (0.6)	0
	60-69歳	636	161 (25.3)	469 (73.7)	6(1) (0.9)	0
	70歳以上	363	51 (14.0)	306 (84.3)	6(1) (1.7)	0
計		8,376	2,621 (31.3)	5,671 (67.7)	83(15) (1.0)	1 (0.01)

赤字はがん発見数

上部消化管内視鏡検査の受診者数は8,376人、このうち男性5,204人、女性3,172人でした。要精検者数は男性57人(1.1%)、女性26人(0.8%)、計83人(1.0%)でした。がん発見数は16件(0.19%)で、胃がん13件、十二指腸がん3件でした。1人は胃と十二指腸の重複がんでした。



受診者数は8,376人、このうち有所見者数は5,755人(68.7%)。70歳以上の男性の有所見率(89.9%)が最も高い結果となりました。

## 上部消化管内視鏡検査における要受診・要経過観察所見(一次検査)

部位	所見	男性 5,204人		女性 3,172人		合計 8,376人	
		要受診(%)	経過観察(%)	要受診(%)	経過観察(%)	要受診(%)	経過観察(%)
食道	食道腫瘍	0	1 (0.02)	0	2 (0.1)	0	3 (0.04)
	食道炎	0	4 (0.1)	0	4 (0.1)	0	8 (0.1)
	食道びらん	0	4 (0.1)	0	1 (0.03)	0	5 (0.1)
	食道潰瘍	0	1 (0.02)	0	0	0	1 (0.01)
	食道ポリープ	0	15 (0.3)	2 (0.1)	6 (0.2)	2 (0.02)	21 (0.3)
	食道粘膜下腫瘍	2 (0.04)	18 (0.3)	0	10 (0.3)	2 (0.02)	28 (0.3)
	食道隆起性病変	0	3 (0.1)	0	3 (0.1)	0	6 (0.1)
	食道裂孔ヘルニア	0	431 (8.3)	0	162 (5.1)	0	593 (7.1)
	胃食道逆流症	15 (0.3)	535 (10.3)	4 (0.1)	111 (3.5)	19 (0.2)	646 (7.7)
	パレット上皮	1 (0.02)	223 (4.3)	0	89 (2.8)	1 (0.01)	312 (3.7)
	食道静脈瘤	1 (0.02)	4 (0.1)	0	2 (0.1)	1 (0.01)	6 (0.1)
	食道カンジタ	1 (0.02)	28 (0.5)	1 (0.03)	2 (0.1)	2 (0.02)	30 (0.4)
	食道白斑	0	4 (0.1)	0	1 (0.03)	0	5 (0.1)
胃	胃がん	2(2) (0.04)	0	1(1) (0.03)	0	3(3) (0.04)	0
	胃炎	5 (0.1)	688 (13.2)	3 (0.1)	327 (10.3)	8 (0.1)	1015 (12.1)
	萎縮性胃炎	1 (0.02)	1,828 (35.1)	3 (0.1)	904 (28.5)	4 (0.05)	2,732 (32.6)
	化生性胃炎	0	64 (1.2)	0	27 (0.9)	0	91 (1.1)
	胃びらん	4 (0.1)	218 (4.2)	3 (0.1)	103 (3.2)	7 (0.1)	321 (3.8)
	胃潰瘍	2 (0.04)	1 (0.02)	2(1) (0.1)	0	4(1) (0.05)	1 (0.01)
	胃潰瘍癒痕	0	58 (1.1)	0	19 (0.6)	0	77 (0.9)
	胃陥凹性病変	1(1) (0.02)	22 (0.4)	1 (0.03)	3 (0.1)	2(1) (0.02)	25 (0.3)
	胃ポリープ	4(2) (0.1)	1,319 (25.3)	1(1) (0.03)	1,100 (34.7)	5(3) (0.1)	2,419 (28.9)
	胃粘膜下腫瘍	0	176 (3.4)	1 (0.03)	141 (4.4)	1 (0.01)	317 (3.8)
	胃腺腫	0	5 (0.1)	1 (0.03)	1 (0.03)	1 (0.01)	6 (0.1)
	胃隆起性病変	2(2) (0.04)	16 (0.3)	1(1) (0.03)	4 (0.1)	3(3) (0.04)	20 (0.2)
	胃腫瘍	2(1) (0.04)	1 (0.02)	0	0	2(1) (0.02)	1 (0.01)
胃表面平坦型病変	1(1) (0.02)	0	0	0	1(1) (0.01)	0	
胃黄色腫	0	21 (0.4)	0	6 (0.2)	0	27 (0.3)	
十二指腸	十二指腸炎	2 (0.04)	43 (0.8)	0	4 (0.1)	2 (0.02)	47 (0.6)
	十二指腸びらん	2 (0.04)	70 (1.3)	0	10 (0.3)	2 (0.02)	80 (1.0)
	十二指腸潰瘍	2 (0.04)	2 (0.04)	0	3 (0.1)	2 (0.02)	5 (0.1)
	十二指腸潰瘍癒痕	0	88 (1.7)	0	25 (0.8)	0	113 (1.3)
	十二指腸ポリープ	0	87 (1.7)	0	25 (0.8)	0	112 (1.3)
	十二指腸粘膜下腫瘍	0	30 (0.6)	0	3 (0.1)	0	33 (0.4)
	十二指腸腺腫	0	1 (0.02)	0	0	0	1 (0.01)
	十二指腸隆起性病変	0	3 (0.1)	0	2 (0.1)	0	5 (0.1)
	ファーター乳頭腫大	1(1) (0.02)	0	1(1) (0.03)	1 (0.03)	2(2) (0.02)	1 (0.01)
	十二指腸のう腫	0	17 (0.3)	0	3 (0.1)	0	20 (0.2)
	リンパ過形成(十二指腸)	0	2 (0.04)	0	1 (0.03)	0	3 (0.04)

赤字はがん発見数

最も多い所見は、男性で萎縮性胃炎1,829件(35.1%)、女性では胃ポリープ1,101件(34.7%)でした。要受診・要精密検査となった所見で最も多かったのは、胃食道逆流症19件(0.2%)でした。